

(2) Hospital General Regional No. 2 IMSS. (3) Unidad de Medicina Familiar No. 8 IMSS

MÉTODO

RESULTADOS

	N	%
Sin síntomas	34	17,2%
Síntomas en los últimos 7 días	55	27,8%
Síntomas en el último año	164	82.8%

Categoría	Porcentaje
Ausencia	17,2%
Síntomas últimos 7 días	27,8%
Síntomas últimos 12 meses	82,8%

Cuando agrupamos las afecciones por regiones anatómicas podemos encontrar que más de la mitad de los sujetos de investigación 108 (54.5%) reportan afección en la región de la columna, 61 (30.8%) refieren afecciones en ambas muñecas.

CONCLUSIONES

REFERENCIAS

- DHHS (NIOSH) publicación N.º 2012-120. Febrero de 2012
- Fernández González Manuel, Fernández Valencia Mónica, Manso Huerta María Ángeles, Gómez Rodríguez M.ª Paz, Jiménez Recio M.ª Carmen, Coz Díaz Faustino del. Trastornos musculoesqueléticos en personal auxiliar de enfermería del Centro Polivalente de Recursos para Personas Mayores "Mixta" de Gijón - C.P.R.P.M. Mixta. Gerokomos [Internet]. 2014 Mar [citado 2022 Nov 05] ; 25(1) : 17-22.
- Nunes, I. L., & Bush, P. M. (2012). Work-Related Musculoskeletal Disorders Assessment and Prevention. In (Ed.), Ergonomics - A Systems Approach. IntechOpen.
- M. Valecillo, L.Quevedo, A. Palma, A. Dos Santos, et.all. Musculoskeletal symptoms and occupational stress among nurses in a military hospital.Salud de los Trabajadores v.17 n.2 Maracay dic. 2009

