

APLICACIÓN DE LA NOM-035-STPS-2018 PARA EVALUAR LOS FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL Y SU ASOCIACIÓN CON LA PREVALENCIA DE SÍNTOMAS PSICOPATOLÓGICOS ASOCIADOS AL TRABAJO EN MÉDICOS DE BASE DE LA UMF 8

Barbara Isabel Rosas Palma¹, David Rosas de la Cruz¹

Hospital General de Zona No. 32 IMSS, División de Estudios de Posgrado, Facultad de Medicina, UNAM.

Correo electrónico de contacto: barbs4046@gmail.com

Palabras clave: Salud ocupacional, psicosocial, psicopatología, factores de riesgo, NOM 035.

INTRODUCCIÓN

El estado psicológico de los empleados se ve impactado por las exigencias laborales que requieren un esfuerzo excesivo [1]. Los factores psicosociales en el entorno laboral abarcan las interacciones entre el trabajo, su contexto, el grado de satisfacción y las condiciones organizacionales, lo que puede afectar la salud mental, el desempeño y la satisfacción laboral. [2]. Estos factores son críticos, ya que están relacionados con el desarrollo de trastornos psicopatológicos, afectando tanto al bienestar del trabajador como a la eficiencia del servicio prestado [3]. Por lo que en este trabajo se evalúan los factores de riesgo psicosocial, aplicando la NOM-035-STPS-2018 y su asociación su asociación con la prevalencia de síntomas psicopatológicos relacionados con el trabajo en médicos de base de la UMF 8.

MÉTODOS


Estudio analítico, observacional, transversal y prospectivo. Se obtuvo una muestra de 99 médicos de 22 especialidades, se obtuvo: edad, género, antigüedad, factores de riesgo psicosocial de la NOM-035-STPS-2018, y los índices globales de malestar psicológico del cuestionario SCL-90-R. Se utilizaron pruebas de correlación para evaluar la asociación entre los factores de riesgo psicosocial y los síntomas psicopatológicos, utilizando SPSS versión 26, con un nivel de significancia de $p < 0.05$.

RESULTADOS

Participaron 35 hombres y 64 mujeres, con una edad de 42.0 años (RIC 37.0 – 48.0), la antigüedad fue de 11.0 años (RIC 8.0 – 16.0). En los factores de riesgo psicosocial, se encontró un predominio de «muy alto» (53.5 %), mientras que el 35.4% tuvo un riesgo «alto». En el cuestionario SCL-90-R, el índice de severidad global (IGS) mostró que solo un participante (1 %) estaba en riesgo. No se encontraron asociaciones estadísticamente significativas entre los factores de riesgo psicosocial y los síntomas psicopatológicos evaluados. Sin embargo, se identificó una correlación positiva entre la antigüedad en el puesto de trabajo y el total de factores de riesgo psicosocial ($p = 0.031$, $Rho = 0.217$).

Total (Factores de riesgo psicosociales)	Bajo	Medio	Alto	Muy alto	p
Índice (SCL-90)	n (%)	n (%)	n (%)	n (%)	
IGS					
Con riesgo	-	-	-	1 (1.9)	0.831
Sin riesgo	1 (100)	10 (100)	35 (100)	52 (98.1)	
TSP					
Se muestra mejor de lo que esta	-	-	5 (14.3)	5 (9.4)	0.479
Se muestra peor de lo que esta	-	-	-	4 (7.5)	
Se muestra como es	1 (100)	10 (100)	30 (85.7)	44 (83.0)	

n: Frecuencia, %: porcentaje, IGS: Índice de severidad global, TSP: total de síntomas positivos
Fuente: análisis de datos recolectados.



Fuente: análisis de datos recolectados.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los factores de riesgo psicosociales no estuvieron asociados con la prevalencia de síntomas psicopatológicos; no obstante, la antigüedad se correlacionó de manera positiva con los factores de riesgo psicosociales, sugiriendo que la exposición prolongada podría influir en la percepción de estos riesgos.

Referencias

1. Mur de Viu C, Maqueda Blasco J. Salud laboral y salud mental: estado de la cuestión. Med Segur Trab (Madr) 2011;57(1):1-3.
2. Ruotsalainen JH, Verbeek JH, Mariné A, Serra C. Preventing occupational stress in healthcare workers. Cochrane database Syst Rev 2015;2015(4):CD002892.
3. Mingote Adán JC, Núñez López C. Importancia de la consideración de la salud mental en la gestión de la salud laboral: una responsabilidad compartida. Med Segur Trab (Madr) 2011;57:239-62.